


Estadísticos mensuales

Estad.	MVD	LPa	Col	IdF	PdE	Aty	BAs	MdP	PNr	TOy
BIAS (m)	0.04	-0.08	nan	nan	-0.03	nan	0.27	-0.01	0.48	0.08
RMSE (m)	0.21	0.15	nan	nan	0.17	nan	0.48	0.13	0.58	0.27
R	0.89	0.9	nan	nan	0.93	nan	0.74	0.96	0.77	0.86


- **BIAS o sesgo:** medida de la habilidad del modelo para representar el estado medio.
- **RMSE:** precisión del pronóstico considerando la influencia de los mayores errores.
- **R o correlación:** habilidad del modelo en reproducir el patrón de las mediciones.

Series temporales - Costa uruguaya


Montevideo (Niveles referidos al cero Wharton)




Colonia (Niveles referidos al cero Wharton)




Isla de Flores (Niveles referidos al cero Wharton)



La Paloma (Niveles referidos al cero Wharton)




Punta del Este (Niveles referidos al cero Wharton)




Series temporales - Costa argentina


Atalaya (Niveles referidos al cero Wharton)




Buenos Aires (Niveles referidos al cero Wharton)



Mar del Plata (Niveles referidos al cero Wharton)



Pilote Norden (Niveles referidos al cero Wharton)



Torre Oyarvide (Niveles referidos al cero Wharton)

