

Variable aleatoria y función de distribución

Ejercicio 1

Sea X una variable aleatoria (v.a.) que toma los valores $\{-2; -1; 1; 5; 5\}$ con probabilidades $\frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{4}$ y $\frac{1}{4}$ respectivamente. Graficar su función de distribución.

Ejercicio 2

Se consideran las funciones $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tales que:

1.

$$F(x) = \begin{cases} \beta e^x & \text{si } x < 0 \\ \beta & \text{si } x = 0 \\ 1/4 & \text{si } 0 < x < 1 \\ \alpha \frac{x}{1+x} & \text{si } 1 \leq x \end{cases}$$

Hallar α y β para que F sea una función de distribución.

2.

$$F(x) = \begin{cases} \alpha + e^x & \text{si } x \leq -1 \\ \beta x + \gamma & \text{si } -1 < x \leq 1 \\ \delta + \varepsilon x & \text{si } 1 < x \end{cases}$$

Hallar $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon$ para que F sea una función de distribución.


Ejercicio 3

Se considera la función de distribución $F_X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de la variable aleatoria X . Probar que:

1. $\mathbf{P}(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$
2. $\mathbf{P}(X = a) = F_X(a) - \lim_{x \rightarrow a^-} F_X(x)$
3. $\mathbf{P}(a \leq X \leq b) = F_X(b) - \lim_{x \rightarrow a^-} F_X(x)$
4. $\mathbf{P}(a < X < b) = \lim_{x \rightarrow b^-} F_X(x) - F_X(a)$
5. $\mathbf{P}(a \leq X < b) = \lim_{x \rightarrow b^-} F_X(x) - \lim_{x \rightarrow a^-} F_X(x)$
6. $\mathbf{P}(X > a) = 1 - F_X(a)$
7. $\mathbf{P}(X \geq a) = 1 - \lim_{x \rightarrow a^-} F_X(x)$

Ejercicio 4

De las gráficas de la figura, indicar cuáles son función de distribución (f.d.) y cuáles no lo son.



Ejercicio 5

Se considera una variable aleatoria X cuya función de distribución es:

$$1. F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < -3 \\ 1/4 & \text{si } -3 \leq x < 1 \\ 3/4 & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ 1 & \text{si } 2 \leq x \end{cases}$$

Calcular:

- $\mathbf{P}(-3 \leq X \leq 1)$
- $\mathbf{P}(-3 < X \leq 1)$
- $\mathbf{P}(-3 \leq X < 1)$
- $\mathbf{P}(-3 < X < 1)$
- $\mathbf{P}(-2 < X < 2)$
- $\mathbf{P}(-1 < X < 0)$

$$2. F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1/4 & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 1/3 & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ x/6 & \text{si } 2 \leq x < 4 \\ x/8 + 1/4 & \text{si } 4 \leq x < 6 \\ 1 & \text{si } 6 \leq x \end{cases}$$

Calcular:

- $\mathbf{P}(1 \leq X \leq 5)$
- $\mathbf{P}(2 < X \leq 4)$
- $\mathbf{P}(0 < X < 1)$
- $\mathbf{P}(4 \leq X < 6)$

Ejercicio 6

De un grupo de 16 estudiantes de los cuales 5 estudian economía, 4 contabilidad y 7 administración se eligen 3 al azar para formar una comisión.

1. Hallar la probabilidad de que los 3 estudien economía.
2. Hallar la probabilidad de que al menos 2 estudien economía.
3. Sea X la variable aleatoria que cuenta la cantidad de estudiantes de economía que integran la comisión. Hallar y graficar la función de distribución F_X .

Ejercicio 7

Se presentan para un cargo de gerente 5 personas de las cuales 3 son contadores. Luego de estudiar los correspondientes antecedentes, se determina que los méritos son similares y por lo tanto la elección se hará teniendo en cuenta solamente el carácter de contador. El jefe de personal comienza a llamar al azar a los 5 involucrados. Si la primera persona cumple el requisito lo elige, de lo contrario llama al siguiente. De esa manera procede hasta conseguir el candidato contador.

Sea X la variable aleatoria que cuenta la cantidad de entrevistas efectuadas.

1. Hallar y graficar la función de distribución F_X .
2. Hallar la probabilidad que se hagan al menos 2 entrevistas.

Ejercicio 8 **

Dada una v.a. X se dice que θ es una mediana de X si $\mathbf{P}(X \geq \theta) \geq \frac{1}{2}$ y $\mathbf{P}(X \leq \theta) \geq \frac{1}{2}$.

1. Mostrar que si F_X es estrictamente creciente y continua existe una única mediana.
2. Mostrar que siempre existe al menos una mediana, pero dar un ejemplo en que haya infinitas.
3. Sea $X = \theta + \varepsilon$, siendo ε una v.a. con distribución estrictamente creciente, continua y simétrica respecto al 0. ($\varepsilon \sim -\varepsilon$). Mostrar que θ es la única mediana de X .

Distribuciones discretas

Ejercicio 9

La distribución introducida en este ejercicio se denomina *distribución binomial*.

1. Se considera el natural $n \geq 1$, $0 < p < 1$ y el conjunto $A = \{0, 1, \dots, n\}$. Probar que la función $p : A \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $p(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$ con $k \in A$ define una probabilidad en A . Sugerencia: utilizar el binomio de Newton.
2. La probabilidad de que una cierta clase de componente pase con éxito una determinada prueba de impacto es $3/4$. Hallar la probabilidad de que exactamente 2 de los siguientes 4 componentes que se prueban pasen la prueba.
3. El sistema electrónico de dirección de un cohete funciona correctamente con una probabilidad p cuando se pone a funcionar. Se quiere instalar n sistemas de respaldo independientes, pero idénticas, en el cohete de modo que la probabilidad de que al menos un sistema trabaje en forma correcta no sea menor que 0,99. Hallar la cantidad n de sistemas electrónicos de dirección que se necesitan para satisfacer los requerimientos si $p = 0,9$ y si $p = 0,8$.

Ejercicio 10

La distribución introducida en este ejercicio se denomina *distribución hipergeométrica*.

1. Se consideran los números naturales N , D y n tales que $N \geq D$. Sea también $A = \{0, 1, \dots, n\}$. Para $r > 0$, se define $C_s^r = 0$ si $s < 0$ o si $s > r$.
a) Probar que

$$\sum_{k=0}^n C_{n-k}^{N-D} C_k^D = C_n^N$$

Sugerencia: observe que $(1+x)^N = (1+x)^{N-D} (1+x)^D$ y utilice el desarrollo de Newton $((1+x)^N = \sum_{n=0}^{\infty} C_n^N x^n)$ para hallar el coeficiente de x^n a ambos lados de la igualdad.

- b) Probar que la función $p : A \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $p(k) = \frac{C_{n-k}^{N-D} C_k^D}{C_n^N}$ con $k \in A$ define una probabilidad en A .
2. Una empresa quiere comprar cajas que contienen 40 herramientas cada una. El procedimiento de control de calidad de cada caja consiste en tomar una muestra de 5 herramientas al azar de dicha caja y rechazarla si se encuentra una herramienta defectuosa. Si la caja a inspeccionar tiene 3 defectuosas, ¿cuál es la probabilidad de rechazar la caja?
3. Ahora de un lote de 10 herramientas se seleccionan 4 al azar. Si el lote contiene 3 herramientas con defectos de fabricación, calcular la probabilidad de que:
- las 4 funcionen.
 - al menos 2 no funcionen.
 - sólo una funcione.
 - por lo menos una funcione.

Ejercicio 11

Graficar la función de distribución y la función de probabilidad de una variable aleatoria con distribución $\text{Bin}(6, 0,25)$.

Ejercicio 12 *

Diremos que θ es una *moda* de la variable aleatoria discreta X si y sólo si se cumple que:

$$\mathbf{P}(X = \theta) = p_X(\theta) \geq p_X(x) = \mathbf{P}(X = x) \quad \forall x \in R_X$$

Sea $X \sim \text{Bin}(n, p)$

1. Probar que:

$$\frac{p_X(k)}{p_X(k-1)} = 1 + \frac{(n+1)p - k}{(1-p)k} \quad k = 1, \dots, n$$

2. Calcular la(s) moda(s) de X discutiendo según p .

Sugerencia: estudiar el cociente de la parte anterior y compararlo con 1.

Ejercicio 13

En los siguientes ejercicios se asume que los fenómenos se comportan según la *distribución de Poisson*, dada por:

$$X \sim \mathcal{P}(\lambda) \Leftrightarrow p_X(k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \quad k = 0, 1, \dots$$

- El número promedio de partículas radiactivas que pasan a través de un contador durante un milisegundo en un experimento de laboratorio es 4. ¿Cuál es la probabilidad de que entren 6 partículas al contador en un milisegundo determinado?
- Se sabe que 10 es el número promedio de camiones-tanque de aceite que llegan por día a una cierta ciudad portuaria. Las instalaciones del puerto pueden atender cuando mucho a 15 camiones-tanque en un día. ¿Cuál es la probabilidad de que en un determinado día se tengan que regresar algunos de los camiones-tanque?
- Se certifica la calidad de discos de computadora pasándolos por un certificador que cuenta el número de sectores defectuosos. Una determinada marca de discos tiene un promedio de 0,1 sectores defectuosos por disco. Calcular la probabilidad de que::
 - un disco que se inspeccione no tenga sectores defectuosos.
 - un disco que se inspeccione tenga más de un sector defectuoso.
 - dos discos que se inspeccionen no tengan sectores defectuosos.

Ejercicio 14

Se considera $0 < p < 1$ y $R_X = \{1, 2, 3, \dots\}$ los enteros positivos.

1. Probar que $p_X : R_X \rightarrow [0, 1]$ dada por $p_X(k) = (1-p)^{k-1}p$ es una función de probabilidad. Si una variable aleatoria discreta X tiene por función de probabilidad p_X como antes se dice que X tiene *distribución Geométrica* de parámetro p y se denota $X \sim \text{Geo}(p)$.
2. Consideramos un experimento aleatorio donde nos interesa estudiar la ocurrencia o no de un suceso A con probabilidad p ($0 < p < 1$). Cada vez que ocurre A diremos que hay éxito y cada vez que ocurre A^c diremos que hay fracaso. Repetimos el experimento en forma independiente (es decir lo que ocurre en una repetición no influye en las otras) hasta obtener éxito (ocurre A). Sea X una variable aleatoria que cuenta la cantidad de repeticiones. Calcular $\mathbf{P}(X = n)$ con $n \in \mathbb{N}$ (la probabilidad de tener que realizar n repeticiones para obtener un éxito) y deducir que $X \sim \text{Geo}(p)$.
3. El tablero de un conmutador telefónico es de muy poca capacidad en cuanto al tiempo de ocupado se refiere, de tal forma que las personas no pueden encontrar una línea desocupada para sus llamadas.
Puede ser de interés saber el número de intentos necesarios que se requieren para tener una línea disponible. Suponga que $p = 0,05$ es la probabilidad de tener línea durante la mayor congestión de llamadas. Se tiene el interés particular de saber la probabilidad de que sean necesarios 5 intentos para lograr una comunicación.

Ejercicio 15

Sea X el número de intentos independientes (de un experimento aleatorio) que hay que realizar para observar por k -ésima vez ($k \geq 1$) el suceso A , con $\mathbf{P}(A) = p$.

1. Hallar la distribución de X . Esta distribución se llama *Binomial Negativa* de parámetros k y p y se escribe $X \sim \text{BN}(k, p)$
2. En una población con 100000 personas donde 1800 son portadores de una enfermedad, se realiza un muestreo con reposición donde se puede suponer equiprobabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una muestra con 4 enfermos sin tener que seleccionar más de 8 personas?
3. Hallar la probabilidad de que una persona que lanza al aire tres monedas obtenga ya sea sólo caras o sólo cruces por segunda ocasión en el quinto lanzamiento.
4. Si $X_1, X_2, \dots, X_k \text{ iid} \sim \text{Geo}(p)$, hallar la distribución de $X = X_1 + X_2 + \dots + X_k$.